庫全書

子部

普濟方卷三百五十

詳校官太醫院醫士程 泰

編修臣倉聖脈覆勘 校對官中書臣朱 總校官進士臣楊懋珩

騰緑監生臣将風生 炘 火之四年八日 温則緩弱若 虚而風邪 風由帝 附 論 普濟方 9) 損臟腑未 居 風風邪冷氣客於皮 寒則學急唱 撰 汗出多而變產者山產後血虛腠理不密故多汗因遇 腰脊筋急強直者不可治〇産後血氣未完風邪中之 金りせん人丁 視角弓反張神志昏塞便弱遺失癌不能言又有産後 因跌挫傷動臟腑得病之初眼溢口噤肌內瞤搐漸至 力下床或一月之内傷於房室或懷憂怒擾邁冲和或 絡而生病馬0又云産後中風蓋由産後五七日内強 解至於五臟六腑則随所中而證候出馬甚者與飛直 入於經絡則發為產其候口噤不開筋脉攣急面目喎 卷三百五十

今中風口噤及角弓反張各 續命湯稍緩即汗出如雨手捻不開者不可治也〇 搖頭馬鳴身反折須更十發氣息如絕宜速幹口灌小 名曰痙义曰痊當察有汗無汗以分剛染陰陽而治之 弱發成風經之證凡產後口噤腰背強直角弓反張哈 云產後心悶氣絕眼張口弊過身強直腰背反偃狀 風邪搏シ **癇疾心忪號悸言語錯亂皆是宿有風毒因產心氣虚** Jan Chair Jan ...)則變產產者口味不開行強而直如發癎狀 普済方 一類其實一也

開易於中風便昏音有一婦人產後遮設太客門內更 動力四月石首 但無風為佳不可衣被帳褥太暖即汗出汗出則腠理 以交加散囑云服之睡睡中必以左手搔頭覺必醒矣 火睡久及醒即昏昏如醉不省人事醫用愈風散佐 如其言云 急強 出里 恵す 治產後中風言語塞澁精神 卷三百五十

次定四軍全書 一人 當歸散也聖治產後中風手 石為細散同研令勻不計時候以豆淋酒調下 芎藭 本 當歸 骨美 微黄酒浸去皮 當歸炒被 對微差活 獨活 金簿 天南星之分龍腦 普湾す 附子 大大樓場 皮腳 防風或養於 脚頑痺緩弱無力 風頭 做赤到 鳥 研細 去蘆 研頭

右為細散/ 烏蛇 骨炙機黄 搗 惠才治產後中風四肢頑痒令人心腹疼痛 心两半 人麝香相合今勺不計時候以且淋 烏蛇屑是一两麝香細 金底墨 妈 天南星製柏子仁 卷三百五十 羚羊角盾 膝出拍子仁 大麻 菖蒲 膫 研分 獨活 河調 阿

獨活寄生湯出九治產後血虚生風手足抽學筋 九定四軍全書 一 右為末入研藥今勻煉蜜和搖三五百杵凡如梧 人服之立愈有痰間服加味紫石英散 入每服不計時候以温酒下一十五丸 2時發搐搦半身不遂或因勞役太早風邪乗 分麻黄胆颜去 普楽す 八解附子

筋脉攣急 右剉如麻豆每服三錢水七分酒三分同煎七 歸地鬼箭羽出虎杖 温服不拘時候 各半生乳地黄半两 治產後中風偏風聲音不利或只發 两防風出人奏 卷三百五十 桂去粗皮肉茶 1到各半 兩重 附子 皮麻去芍藥 八别研甘草 出田

大王四年至5 右為粗散每服四錢以水酒各半中孟入生姜坐 苗 枳是髮炒機當師到微炒 卷活二茶草做防風去蘆川鳥頭吃雞去桂心 地黄焙丹砂硼白芷瓜半 **线防風去巴戟天法白芍** 治產後中風身體麻痺疼痛 生乾地黄 錢生姜薄荷酒調下不 普齊方 ١ Ā

重りせんと言い 右吹咀每服五錢水一盞半煎至一盞去浑取、 續命湯 清汁入生姜汁再煎|二沸温服日三服夜二服若 煎至六分去滓不計時候温服 急遗失便利 無治小兒篤風及婦人產後失血冒昧不知痛處拘 麻黄高作 杏一 仁作 治中風及剛柔二產血氣痺弱不能轉倒 终 桂心 川芎 卷三百五十 甘草各丰防風云致芍藥 附子 防已 黄芩醇

大七四華全書 一八 防已黄芩革不若大豆紧涡并大里散住而小續命 便痉亦令服小續命湯既汗多如何更服麻黃官桂 黃加葛根之說必有所處雖大豆紫湯大聖散良亦 湯加减並治剛柔二座若柔產自汗朱奉議有去麻 **柔痊自汗者去麻黄夏間及病有熱者去附子减桂** 两附子一枚炮人參等八味各半兩入生姜一聚大 不可偏見曲説有妨古人之意云一方桂防風各 半冬及初春去黄芩陳無擇評曰凡産後汗出多 普涛方

壽星九 金グレガノニ 同煎名人参湯治中風口面唱斜 右細到每服三錢姜棗煎服下利者去地黄一方獨 **枚煎有熱荆芥末炒鳥豆淋酒下** 活的樂熟地黃各二两桑寄生一兩一分當歸 獨活二两 防風 焙 春光 蓝 茯苓 參 桑寄生如無以精杜仲美汁 當歸 卷三百五十 熟地黄淨甘草二两 白芍薬 方姜七片聚二 辣桂 人炙各 細辛 川芎 兩

火を日車をち ~ 五石湯出于 右以五石為末諸樂㕮咀用水一斗四升煮取三 **痰眩冒不知人及濕痺緩弱身體痙妊娘百病** 牡 分杜仲等十味各一雨半名獨活湯 蠣 桂心 治産後卒中風發疾口禁倒悶吐沫與 鍾乳 防己 黄芩 普科方 赤石脂 當歸 白术 乾姜春二 甘草 石膏 枯蔓根 白石英 獨活

四石湯 金にいりたとう 并緩急諸風毒身體痙强及挟胎中風百病 半分五服日三夜二一方有滑石寒水石各二兩棗 二十枚 右㕮咀以水一斗二升煎去三分半去滓分五服 黄芩和二 紫石英 白石英 石膏 赤石脂酚"獨活 生姜略六葛根四桂心 治産後平中風發疾口噤與凝悶滿不知人 卷三百五十 芎藭 甘草 ち継

獨活湯 知母湯 たらりをひける 能言 時候 右㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服不計 万有麻黄無黄芩 甘草 獨活 治產後中風煩悶發 治產後中風手足頑痒角弓反張或口噤不 當歸 生姜酚亚防風 To the second 附子格二萬 普濟方 燥頭痛目昏身體 桂心 白术

到力でたろう 拘急 青湯 终湯 亂 同煎至七分去滓温服不拘時候一方無葛根名石 右粗搏篩母服三錢水一盏酒少許入生姜半分切 知母 桂去粗芍藥 療産後中風心忪悸志意不定恍惚語言錯 獨活去蘆島 卷三百五十 防風去义各半 根坐白水西三甘草及石膏 夏生姜汁

次定四車全書 一 甘草湯 服 右㕮咀以水一斗五升爛煮萬 右㕮咀以水二大升煎至七合下竹瀝二大合分? 甘草 白鮮皮 治産後腰背及脇肋一 黄芩粉碎 杏仁枝十 甘丝 干酪四石膏汁 普瀬す 麥門冬 不得轉動名曰風症 麻黄為二枯葉根 根半斤取八升去

胡三两 右為粗散用羊肉二斤葱白二七並以水五升燙取 内樂煮取三升分再版一 **八三升每用肉汁** 生姜 治產後體虛中風四肢疼腹內疙痛 桂心 附子此縣去號的 中意樂木四錢煎至六分去沒 卷三百五十 劑不差更服良一方有前 生乾地黄 當歸

鳥金煎 とこうはんな 右細對每服四錢以水 **小計時候溫服** 剉赤 分煎至六分去滓不計時候温服 治産後中風言語謇溢心神恍惚筋脉 治產後中風發熱面亦氣喘頭痛 生氧地黄 中蓋入竹葉 漢防己 <u>†</u>

多分四人名言 石斛浸酒方 右細剉以水八升煎至三升絞去淬更熬成膏 不計時候以温酒調下 桂心 治產後中風四肢緩弱舉體不仁 當歸 酸聚仁做生乳地黄品 以清酒一斗浸三日每服不計時 卷三百五十 一匙 膝击茵芋 防風去蘆 桂心

羚羊角湯 防風湯 候煖 煩熱欲飲水乾嘔關節勞痊中風之疾 有乾桑耳無乾姜名人祭湯 石㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服日三一 防風 甘益 治産後中風背急短氣 小蓋服之 乾姜香二 獨活 療産後腹中堅硬兩脇膈脹手足冷心中 尚根各五當歸 普齊る +

當歸湯 動分四母全書 多忘精神不定 右以水二升煎取八各空心二服畢即吐良久更 桂心 川獨活 羚羊角分防風 垛胡 治產後中風半月手足不遂言語養溢於 一分 當歸 **升煮取二升半分為三服覺** 六浸過各 ち樂 卷三百五十 防風 苦梗 各

增損柴胡湯 减桂心||半加薄荷 加白术五兩有氣加生姜六分手足不遂加斗滕五分单 服二十九一方用天麻二分有熱加乾葛五兩有冷 離二兩 黄耆四兩腹痛加當歸 5 藥各三分不食加人疼 生姜汁煎若暑中三陰所患必熱小續命湯去附子 四分玄参四分若寒中三陽所患父冷小續命湯加 **剩漸蹇湏適寒温將息如不瘥即以此方作九每** 治產後經水適斷感於異證手足牽

たこりまとき

普濟方

金少口乃石量 煎至一盏温服無時 右為粗未每服半兩生姜同煎服東四個水一蓋坐 四知母送 昏冒緊屬上焦 前證已去次服此以去風邪 黄本四线 樂科柴胡致防風 人参 卷三百五十 四 半夏錢三甘草灵

大きりをいき 風 ~荆芥穗五錢松殷麩炒去穰同! 日經水復行前證退宜服剂 雨 各二 日後脾胃之氣無除風邪宜防風湯 林黄去根節八兩 當歸坊黄 治婦人 人產後中風卒然瘖症及治偏 **参去黑** 普濟方 ·盖煎至七分温服無時 一三十.枚去皮 、柴胡湯煎服 雙仁炒 小柴胡小料

金贝巴及白色 雅半 右剉如麻豆每服三錢水一盡生姜三片煎至 本門 右㕮咀每服五錢 梗 甘草馬 附子大者一枚桂去產 浮温服で 台再前的 治產後中風發熱面赤氣喘頭目昏痛 萬根 拘時候千金方用大東前 **数沸温服能言未瘥服** バルル 卷三百五十 人參 盖半前七分 防風去义各桔梗炒 |去魔皮 啊 小續命湯 方温者か 勿

たいかられたから 濟危上丹 倒活煮散 半夏一方無附子 右吹咀每服五錢水一盏半生姜三片同煎至 去滓温服日二 獨活去蘆頭當歸 去站 夫產後中風者五七日内強力下床或 治座後中風 及相生乾地黄焙谷黑豆 於血室或懷蕩冲和或因火 普湾す ţ,

金少四人白雪 治是自作招風中 王唇青肉冷汗出目跑神昏命在湏更若以風樂 则娱矣 同研不 乳香 **得病初時眼澁口噤肉擋** 九如梧桐 五靈脂 入鐵器內微火焙乾為細末用生地黄 真阿 疾或血下過多虚極生風氣無所 卷三百五十 硫黄 大空心温酒或當歸酒春一 卷柏子各等 大陰玄精石 強直 細 研陳

たこりをいう 所為岩頭疼服此方 柴胡湯 進三服若頭不痛但煩熱與後方三物黄苓湯 右吹咀以水一 柴胡 一方不用阿膠 治婦人 半夏谷半 治婦人草莓 Ξ 啊 一斗二升煮取六升去浑每服 jī 在海得風熱四肢苦煩皆自發露 普濟方 工傷風四肢苦煩熱頭 1各三 支 E)

金只口屋有電 川芎湯 右㕮咀以水 右 多吐下蟲 黄芩 吹咀水四升煎取二升分温三 桑白皮 柴胡湯頭不疼但與此樂 療産後中風身背拘急如東并渴 人於防風好 羗活 告奏的二氧地黄 升煮取 羚羊角屑 卷三百五十 升去渣適寒温服 兩四 酸東仁 服 E 四

尺迁四年入時 獨活防風散 角弓反张 取微汗為度一方有防已 右除竹瀝並細剉分作兩劑每劑用水五盞入生姜 麻黄 分切煎至雨盏去滓下竹瀝更煎三两沸分温服 去根節 治產後中風四肢拘急筋節掣疼 作三分 1 治産後柔風 半一部竹雅半 桂 普濟方 粗 丰 兩 啊 防風去 ナ

防風酒 金少し人 右㕮咀以酒二斗渍三宿初服一 右擠羅為細散每服三錢空心豆淋酒調下三服 日三 獨活去盧防風 防風 秦九士白木 兩五 治產後中風 獨活各一 各 二两 二兩 牛膝去苗當歸地芍藥 香荽 桂心的二萬子而石斛 合稍加至三四合

次定四車全書 ! 甘草湯 大豆湯 由中風内絕藏氣虛所為 右以煮豆水一 酒五升合煎取五升分五服日三夜二間粥服 大豆 甘草 獨活的三生姜的 治產後腹中傷絕寒熱恍惚狂言見鬼此病 三升 豆澄清更煎 治產後中風頭面手臂通滿 樂各五年內三通草 升内藥後添水 煎取一升 持済す 後華 附子 斗煎取五升 + 白术

全蠍散 獨活轧姜湯 右以水二升煎至一升作二服 六升去滓分五服日三夜二一方用當歸 右吹咀以水一斗六升煮肉取一斗去肉内藥煮取 反張重者名為葬風蓋由觸犯所致 獨活鄉甘草此東美 全蠍 治產後中風諸風皆治之 治產後中風口噤不任身體強直角弓 砂糖 卷三百五 生量後六

獨活湯 於定四庫全書 肉取汁 右除羊肉外剉如麻豆大每先以水二 肉當歸沿 右為末用頸白地龍檮如泥以井花水調前藥服 服 肥羊肉 獨活去益頭 日令盡 治庭後中風或虚汗多因之體熱頭痛 一升澄清去肉入藥 兩半 切半斤當歸切焙去脂膜當歸切焙 治產後虚弱受風欲得補氣除風 苦酒す 八年老活五益 切焙 錢煎去二盏去沒 各 第各二 舸

大豆湯 獨活酒 温服不拘時候 風無治在葬諸疾 右粗搏篩每服三錢水七分酒三分同煎七分去滓 右吹咀以水一斗二升煮豆取八升去豆內藥 四升去浑分六服日四夜二 豆五升炒葛根 治產後卒中風發病倒悶不知人及姙娠挾 治産後中風言語蹇滥腰強直 獨活各八 兩 防己两六

次定四車全書 一 羊肉湯 性服 右以水一斗三升煮取五升去滓内酥一升更煮取 右吹咀以酒一斗半漬三日飲五合稍加至一升随 及男子虚劳冷盛 二升分温三服 羊肉广香豉 獨活一桂心三秦九 治產後中風久絕不產月水不利下亦作白 成棒大蒜去皮切 普湾す 大出 出 五啊 九

荆芥湯 獨活酒 酒服之 口噤 封二日以湯煮瓶良久服八合覆衣取汗速以豆补 右以酒五升先渍二味經宿大豆乗熟投中攪勻 卷活两防風雨大鳥豆今拆炒 荆芥 治産後中風四肢麻痺不仁或角弓反張升 治產後中風不省一名獨活湯 獨活 防風谷等 卷三百五十

地黄酒 人というしいた 服之 右煮地黄四五沸入姜酒更煎三沸任性細細飲冷 多加桂末二兩熱多加生藕汁二合一方用地黄 時候如牙關緊用白梅熊腦子擦便開 升炒令黑寶瓶中熱酒三升家封口令减生 細剉每服半兩水一蓋半煎至一盞去滓温服 生地黄汁非生姜汁仁清酒三升 服黑豆酒已再服此方

多分口人有言 骨成以手摩十遍瘥日! 右㕮咀以苦酒九升渍 右檮羅為散每服三錢空心熱酒調下日再服 紫葛去心 木防己 治産後中風流腫 四两 治産後柔風 一件笛子 治產後中風身體痺麻四肢筋脉攣急 千焙半卷活去蘆頭 卷三百五十 宿猪膏四升煎三上三下

右以水一 右為細木每服二錢水一盡 酒少許煎至七分灌之! 之又浴婦人陰冷腫痛凡風腫面欲裂者仍服紫 **猛紧渴乃炒黑豆作者** 鹽 今黑炒 治婦. 一石煮鹽作湯内雞毛烧着湯中適冷煖浴 荆芥穗子等 鶏毛一把焼 ,産後中風不省人事口吐 涎沫

欽定四庫全書 雞屎醴 屎吹淋大豆取汁每服一升重者凡四五服極効 後中風口噤拘急困篤腰片強直時時反折 右先炒豆今聲絕次炒雞屎今黄以酒一 如牙關緊急用匙斡開微灌之但下咽即生不問多 ,便服不可以樂味尋常忽之 烏雞屎上大豆 治產後中風腰脇不得轉動 療產後中風男子諸風升產後百疾又治產

黄土酒 えらりはいい 腹迷悶欲倒者如上劑服 痛肚熱暈眩皆治如少酒た速產後血衂血悶築心 般並哈療之○危氏得効方多及血氣口噤項強頭 為末酒調服平旦腹痛酒下三錢產後尤不可闕女 右交加互以汁浸一 禁衛不通經脈不調腹痛如擬氣多血少結聚為 治産後風痙不得語腰背着床不得口噤 一日次日各炒黄渍盡汁為度乾 普齊す 五两 枛

動分四月百世 紅花子湯 物白鮮湯 者亦可酒滴水煎服亦可與白鮮皮合養之 用川獨活三兩細切以水三升煮取一升分服禁酒 物獨活湯 石檮羅為散以温酒調二指搖服 白鮮皮治之如前法 竈中黄土 瘵産後中風煩渴 治證如前 療産後中風虛人不可服他樂者 等分 卷三百五十

毛活散 治中風口噤手足麻痺百青身體強直反張 7.17.14 7.1. 用乾竹燒頃之有汁出兩頭以硫盛之取瀝飲之佳 用羗活三兩為木每服五錢水酒各半煎服一方酒濃 每二升分五服温温頻服之 用竹瀝三升以篁竹籤一尺五寸長磚架起仰着下 以紅花于五合炒微熟研碎以水一 起頭徐徐呷之 治產後中風言語零遊四肢拘急 皆濟方 一升煎取七合每 Ŧ

彭贞四库全書 冶產後中風血氣騰邪 治産後中風 冶產後中風身痙直眼口角及目外皆向上牽 取雞子 煎羗活温服亦治中風子腸脫出 無他證服此即愈 事 一箇 酒煮汁服之彌佳 卷三百五十 憂悸無逆 、調服後醫治他病如

炎定四車公司 治女人中風血虚問產後血暈悶欲絕者 大豆紧湯 所為 **訖濾出豆取豆汁每温服|** 用猪心 熱或頭身背重或身痒劇者嘔逆直視此皆因風濕 以大豆三升炒分聲絕取器盛清酒五升沃熱豆中 以生羊血飲一合即蘇 校切於豉汁中者五味機調和食之 治婦人產後中風困篤背強口噤或但煩 骨満す 一盏日五七服温覆取徵 五

烏鵐散 垂じ 异茱萸飲 服破血防風湯佳如姙娘傷胎死腹中三日服此即 用具菜更湯洗焙轧炒四兩每服半两水一盏半 **瘥亦有加羗活者亦佳** 用鳥頭 月繞潤則愈 盖去滓温服不拘時 治產後中風及暗風頭旋 隻去嘴瓜 治産後中 則去風二則消血如服竹瀝産婦常 **水後從春上破開不出腸胃以真** 卷三百五十 風腹痛

たこの東心島 獨活當歸湯 乾猛火煅通赤取出出火毒良久入麝香半两細研 草炒二錢半同煎服 **虎糞實築腹中今滿縫合以甕罐盛用黄泥封裹候** 為細末温酒調下三錢如徽喘加杏仁炒去皮尖甘 為散每服不計時候以暖酒調下二錢 荆芥穗二錢桃仁五錢炒 治産後中血風眩瞀精神昏昧 治産後中桑風舉體疼痛自汗及除百 普湾す 蓋

愈風散 我父旦人人自己 若上氣者加桂心二兩不瘥更作 鴻欲死及治產後中風鼻衂名曰辱風 弓狀亦治血暈四肢強直不省人事或口喋眼斜吐 右吹咀以酒八升煮取四升去滓分四服日三夜 疾一名小品汤 取做汗出引潤則瘥葛氏方單用獨活小品加當歸 獨活 两當歸 治産後中風口噤牙關緊急手足與澱如角 两四 卷三百五十

海神散 大定り車公馬 便亦可其効如神若口噤者灌之齒斷噤者吹鼻中 折四肢搐搦以荆芥穗子為末酒服名如聖散一 皆效一方荆芥煎湯一盆坐之先熏後淋沃若眼反 用荆芥略焙為末每服三錢豆淋酒調下用童子 作中風治之恐產時損動子宮風因而入子藏謂之 用古錢煎湯調服名一捻金散危氏以舉卿古拜 味蓋切脚隐語以秋之也或用當歸同煎頻服良 治產後身錐強直搐搦不反張無汗出亦宜 普渡す 灵

白水酒 重りせん 用魚鰾 破傷風證 蝉退汤调下 細切酒三升煮取一升頓服刻 以白水為細散温酒調下二 1: 17 風腰背強直 治產後風痙偏身冷直口噤不識 两剉以蛤粉炒黑去粉為細末作 一時時反張名曰風痙 卷三百五十 一錢七一方用白术四兩

大三日日八十 治産後中風肌肉頑痺肢節牽 右吹咀每服 **火枚** 炒去皮 附子 防風 桂 防 風 1 桂心 炮去皮 乾萬 獨活 獨活 白水 两水煎有汗者不可服 羗活 羗活 川芎 普済す 草解和半 細辛 春尤 抽非時增寒大腑虚冷 豆蔻 防己各四杏仁 續斷分 當歸兩 節去 Ī

金分正尼有量 治産後中風四肢躁身體疼痛精神昏悶大腑衣熱 通 石為細末每服四錢水一蓋二 石為細末 和淬实 根卷活 獨活 錢水一盞五分煎取一盏二分空 卷三百五十 乾萬 細辛休 防風 五並同前

 於定四軍全書 治産後心虚中風心中 治產後腎氣虛弱風邪所中因而病傳其所傷必感腎 古為細末每服二錢水一盞煎一 八腑傷冷 藿香 石斛 細辛 人參 Ą 當歸 菖蒲 沉香 將捕既與前方樂了即宜與此抑 普湾す 戰慄驚動不安每日如 續斷 紫石英 两沸去浑实 桑寄生 チハ 白石英 獨活

臂邪樂免令干心也 右為細未熟水化阿魏和塞九如梧桐子大早朝 ! 湯下五十九日午或晚前空心復可學 神或搖搦如癎方 石斛 **亦香冷** 治産後中風或口噤或角弓或狂言如見 卷三百五十 上茶英 |半两 防風 獨

次至四車至馬 血 灌牧如無汗却宜葛根湯 其有汗無汗以分剛柔二座無汗惡寒名曰剛痉有 汗不惡寒名曰桑痉若有汗冝服此方 石剉末每五錢姜四片聚一枚水 右剉為煮散每劑六銖不拘時候煎服亦治 **当樂** 活人書日新産血虚多易中風當祭 甘草 普済方 《三味各乾葛六錢 三钱丰 一盏半煎 荒

葛根湯 經循頭上頰至日銳哈此二經為風寒所中使經筋縮 金り ·勝明經入上萬中環出夾口環唇下交承漿手太陽 灌牧却以萍衣盖覆取汗為妙 右剉末每五 占 引於賴故為口唱解言語不正目不平視也 中 71人 風口唱附論 一錢姜四片東一 卷三百五十 盡半煎、 · 各二錢 が温

獨活湯 人气可事心時 眜 竹瀝 右將 獨 硫 和辛去苗 一两半枳殼 味粗禱節發服三錢水 合煎至七分去滓服不拘時 治産後中風口面喎斜語漩筋脉拘急 治産後中風口面唱斜手足不随 去粗皮 風去莫荆實各 一盏半煎至一 當歸 切培各竹雅 Ŧ 栭 啊 一盏

竹雅湯 金グレんろう 拘時 炒八十枚七皮火雙仁 芎藭 粗搏節每服三錢水一盏半煎七分去滓温服 竹瀝年防風五火 去來始三兩甘草又桂去粗皮 治產後中風口唱言語不利手足不隨 两半 心 石膏两 杏仁 大皮头雙 卷三百五十 ·沐焙一两半 古一分 了 河頭 桂皮 外尾活五 桂皮 去皮尖雙 粗

Walls of J. L. 右除竹瀝外粗檮節每服三錢水一蓋煎七分去滓 石檮為散研勻妥服二錢空心薄荷酒調下 ,竹雅半合再煎至七分温服不拘時候 桂去粗白殭難以防風去延胡索各半 天麻 到防風去附子吃去皮臍枳實 治產後中風口眼唱斜筋脉不利 治産後中風口面唱斜 荆芥穗 生乾地黄焙獨活或當歸 去禳处炒 两半

桂心湯 新好四届全書 半合再煎三兩沸温服不拘時 至七分去滓温服不拘時 右剉如麻豆每服五錢水一蓋半入生姜半分切煎 粗捧節每服三錢水一蓋煎至七分去滓入竹歷 桂心去租皮升麻 黄去抹烙一两獨活去廣杏仁去皮火雙仁 两半 治產後中風口喝言語不利筋脉拘急 麻黄去根節煎掠 卷三百五十 防風去义各学期

火定四車全島 四 地黄湯 防子炮裂去 电多四分柱到一次系统 教育根煎掠去 医口吗 附子湯 右將獨活粗搏篩每服三錢水一蓋煎至六分入地 服不拘時候 右剉如麻豆每服五錢水一盏半煎至七分去滓温 生地黄汁竹雅各半獨活去羞頭 治産後中風口唱面解語游不利 普瀬方 1

筋脉手三陽之筋結入於額產則勞損截腑傷於筋脉 故令口噤也 風若垂之其三陽之筋脉則邪偏搏之筋得風冷則急 Í 產後中風口噤是實血氣虚而風入 黄汁竹瀝各一合再煎取七分去滓温服不拘時 中 風口噤 治産後中風口面唱料一名小續 附論 卷三百五 人於頷賴夾口之 類湯 す

次定四車全書 !! 膏為'甘草1防風等十一味私人生姜半分同煎若口 右以水七升先煮麻黄椋去沫下諸樂入竹瀝煎取 反偃狀如痺痙 防風去 當歸炒 從茶 殺分六 石膏 苗 去滓温三服忌松菜猪肉生冷一 療産後心驚中風口味心問通り強直 人努 川芎 竹雅升二 普濟方 獨活 白鮮皮 防し 方麻黄石 甘草炙

烏蛇散 金りい 蛛构開口灌之 右吹咀以水一斗二升煮取三升去浑分三服日三 根湯 开産後諸疾 萬根 茯苓 烏蛇肉 治產後中風口噤四肢抽搐 治產後中風口噤痙痺氣息迫急眩冒困頓 石膏 生姜為六獨活四當歸 八分黄鱼 人參 天麻 卷三百五十 白木 村柱心 小三甘草 芎藭 幹草 防風各二 桂心 檳榔

たこりしんか 右為細末入麝香令勻每服不計時候以豆 淋酒調 炒微等於人 犀角屑谷半麝香 老活二麻黄小两去防風去秦九 治産後中風口噤昏悶不語身體痙直 附子炮銀去當歸到 特游方 枛 獨活 表 雙仁处 甘草

多少四人人一 偃心中驚悸 右為散每服四錢以水一中蓋入生薑半分煎至五 右為粗散每服四錢以水一中盡入生姜半分煎? 黑豆炒點 羚羊角盾 八竹瀝半合攪勻不計時候构開口灌之 苗麻黄去根赤芍藥 治產後中風口噤眼張筋骨強直腰背反 防風盖芎藭 天麻 卷三百五十 生乾地黄山各桂心平 當歸出做

尺足四年八月 白殭鑑散 羌活湯 右攻咀水九升煮麻黄去沫後下諸藥取二升分為 五分去淬入竹瀝半合不計時候构開口灌之 白殭盤以天南星 羗活 服有汗不可服 生薑 治產後中風口噤慣問不能言身體強直 外附子地 防風 治產後中風口噤 首合仁 泰儿 普濟方 桂心 粉草 稍微桂心 去十節分 葛根多三 ž

獨活散 灌之 右為細散每服不計時候以生姜酒調半錢扚開 右為粗散每服四錢以水酒各半盞煎至六分去沒 杏 獨 到碎 當歸炒做 活 治產後中風口噤肩項強直四肢拘急 防風 各二两附子去皮臍 桂心去 薩頭附子半两紀 杜 臍 烏蛇肉酒拌 根節細辛非 啊 防 甘草 頭去 蓝 **飲定四庫全書** 大南星散 六分去滓不拘時候温服 右為粗散每服四錢以水 不計時构開口灌之 天南星鬼蝎梢生白附子鬼鳥頭鬼歌去 膝當歸地 桂心各半 当防風去蘆葛根到各獨活一 治產後中風口噤不開神思昏問肩背強急 治産後中風口噤四肢強直 頣 普湾す 中盡入生姜半分煎至 平 附子起聚 麦

開口灌之 荷酒調下 右為細散研入職粉令与每服不計時候以生姜紫 炒轧各用生姜半雨 細散每服不拘時候以生姜薄荷酒調半 麻子白附子與天南星與乾蝎以半夏 治產後中風口噤 一錢 去皮 半 啊 姜三分去皮橘今三分涉洗洗遍去 同 爛滑炒以 轧生

又方 次定四車全馬 麻黄散 獨活湯 右㕮咀以水二 时候温服 石為散每四錢以水酒各半蓋煎至六分去滓不計 獨活 去根白术 治產後中風極通身拘急口噤不知人 分乳島 節 **瘵産後中風口噤** 升黄取 かか甘草か 獨活谷 一升分為二服 生姜如 Ī 事

叉方 治産後渾身厥冷非時口噤不識 右以酒 用雞糞白一兩炒令黄以酒 温 分温二服 白术 獨活一兩竹雅 —服 羗活 大盞同獨活末煎至七分去滓入竹雅分 卷三百五十 大盏煎五七沸

といりまたいよう 筋脉挟寒則擊急也 客於肌膚經絡則令人頑痺不仁贏之少氣風氣 未淌而起早勞役動傷臟腑虚損未復為風邪冷氣初 夫中風筋脉攣急者由産後氣血不足臟腑俱虚日 右為細末每服三錢熟湯調下空心喫 桂去炙艾葉 义 天南星鄉 贬 中風筋脉四肢攣急 Ŋ 普湾す 當歸 兲 F)

羌活散 多少口屋 台重 右為細末以豆淋酒調下二錢隨時服 蛇散 羗活 す り半川芎 化蛇肉 牛膝 治產後中風四肢筋脉攣急疼痛 治産後中風四肢筋脉攣急皮膚麻痺 天麻 薏苡仁 今黄 天南星心歌土蜂咒雨酒拌天南星一兩土蜂咒 防風 羚羊角 卷三百五十 柏子仁 桂心科當歸 附子此谷麝香研 鹿角膠炒各 炒飲草 酸 柯

項強直 節赤箭 半去两各 1.1. 普齊す 風四肢 防風 一般羚羊角屑 附子炮

活酒 川芎 獨活 節 防風 啊 各半

人にというという 細辛散 右㕮咀每服四錢水酒各半盏煎至六分去滓温服 有汗者勿服 細辛 紅藍花 治産後中風手足不遂筋脉攣急不能言 枳炭半兩处炒 樂各三 肉桂去粗獨活 薏苡仁 以水酒各半中盖入生姜生 普濟方 附子起及當歸少 7

多りせんとう 候温服 風去蘆 時温服 卷三百五十 孟煎至六

たこの事心時 側子散 時候 右㕮咀每服四錢水一盏煎至六分去滓温服不拘 言語賽遊 羗活 防風 侧子 治産後中風四肢筋脉构急疼痛心中悶亂 去皮脾判一两半炮裂 一轧地黄 當歸 9 普消方 羚羊角盾 子炒分 炒班 桂

獨活散 右為粗散每服三錢以水一中盡煎至六分去滓 六分去滓入竹瀝半合相和今勻不計時候温服 石為粗散每服四錢以水一中蓋入生薑半分煎至 去蘆側子 獨活 頣 治産後中風苦背項強四肢拘急不得轉動 兩麻黄 當局少則根 **皮**炮 联去 頭 一两去 甘草 卷三百五 做生乾地黄 膝击海桐皮出各 做赤到穹藭 五加皮 防風

血風散 たこの事とい 夫中風角弓反張者由體虛受風風入於諸陽之經山 右為細末加半夏黄耆以一半為凡煉蜜如梧桐 春竹 歸 時候温服 半為散温酒調下九樂五七十月 療產後諸風痿攣無力四肢不利 風角弓反張門論 地黄 羗活 茯苓 防風 善済方 白术各等 白芷 川芎 当 樂 里 三 當

侧子散 |枸急反弓腰背如角弓反張之狀故以名馬 多少と人一 相維持產後血氣不足風邪垂虛中於陽經使陽脉 、陰陽經絡周環於身蓋皆為陽復為陰陰陽 侧子 す 治產後中風角弓反張手足強硬 皮脈 梨去 防風 節阿膠梅碎泉 卷三百五十 細辛 當歸 赤茯苓 獨活 白鮮皮

竹雅湯 火定四車至書 煩亂恍惚忘誤迷感不知人事口噤不開手足緩縱 葱豉粥投之汗出効 右為細散入研樂今勻每服以緩酒調下 及治産後餘病體虚受風煩慣欲死 頭地銀去乾薑地細辛去苗 治產後中風角弓反張及賊風入腹腹中拘痛 苗甘草多防風之當歸一兩 首学 Ų 普湾方 皮骨炙今黄二两酒浸去 兩 型 去租島 去黑 业

右剉如麻豆每服三錢入竹瀝并水合一蓋煎取六 分去滓温服不拘時候 頭黃者對 犀角屑 五 苦祭百 治産後中風如角弓反張筋急口禁 烏蛇 酒浸去 成骨炙船辛素 考弱 卷三百五十 防己 麻酒漫蜀椒去目 白茯苓皮黑白木各半 去目并閉口前 獨活達 北

炎芝四華 紅島 煖浴室內澡浴一次今身內外和煖浴後再服每日 石擣羅為散每服三錢温酒調下或二三服後 四事公告 图 并也 中骨炎今黄色 次住不可太汗出慎風冷 大麻 治產後中風如角弓反張言語零溢 白附子此級大南星北尾活 防風去蓋桂心 普齊方 陈砂鄉研水 記縣做 一般表記 白疆縣做 日市

右除丹麝外擠羅為末和勻煉蜜為凡如梧桐子 候以温酒研破十九服之 右為末入研藥今勻煮槐膠和九梧桐子大不計時 **母服用二十九温酒下不計時候** 皮骨炙白殭鑑炒乾椒去土麻黄去根節沸湯丹酒浸去白殭鑑炒乾椒去土麻黄去根節沸湯丹大麻酒白附子吃天南星吃桂去粗獨活去烏蛇 半两具菜更炒各麝香别研 治產後中風角弓反張筋脉強直 **核三百五十** 大王四年 八号 防風散 右搖粗散每服四錢以水一中盞煎至六分去淳 防風 時候温服 心分獨活而漢防己 五 為根坐弓弱 治産後中 颐 治産後中風角弓反張并口噤 去沫焙乾煎 做黄各人去皮尖 火雙仁 掠 防風 啊 曼荆子る三 去根節甘 生乾地黄 土去租白木剉, 強直疼痛

金りせんと言 當歸 小杓時候 **剉如麻且每服五錢水** 去皮尖段仁 焙桂皮粗 治産後角弓反張筋急疼痛 尚歸 十枚 卷三百五十 姜炮各异菜 盡半羊脂 甘草炙细辛 盡前至 去苗生乾地 大同前 各

たとり年入り 茯苓湯 右粗搖篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓温服 七分去滓温服不計時 小拘時候 桂虫 相具朱萸炒細辛去苗乳姜吃各熟 治産後中風身如角弓反張口味 治產後身體強直如弓反張 治治方 哭 各

あびでたろう 盏去淖温服不拘時 右剉如麻豆每服五錢水二盏入生姜半分煎取 羚羊角屑 當歸到做炒獨活 一根節 治産後中風身體反張如角弓狀 細辛 防風去蘆

人足可華心馬 龍腦散 大黄湯 錢 古為散每服四錢以水 右為末1 分去滓不計時候温服 龍腦細膩粉 治産後口味り體如角弓反張迷問 治産後中風角弓反張不得俛仰 天南星用酒一升微火煮今 人乳鉢中再研今勻不計時候以媛調! 普濟方 一中蓋入生姜半分煎至六 天麻 里

防風湯 右粗搖節每服三錢水 右細切以水 雨吳芽 防風 分去浑温服不拘時 齊產後中風 痙腰背強直 川獨活 葛根 火 椎 川芎 防巴各六杏仁 卷三百五十 始熟乾地黄焙桂 盏 地黄 入羊脂一 一時時反張 五枚去皮 東大同前至 人去甘草 *6*}}

獨活湯 次定四軍私島 豆淋獨活酒 煩熱身重嘔吐直視 去滓温服不拘時 右到如麻豆每服五錢水酒共一盡半同煎至 分温三 細辛 獨活 去蘆頭當師 服有汗者不可服 去苗葉 治產後中風角弓反張口噤發痙 雨半 Ī 治産後中風形如角弓反張口紫涎 麻黄去根 .普濟方 炒到 防風 名獨活紫湯 節煎 各去 三义 啊 掠 分剉 附子 去一皮枚 四八 臍炮 盏

金グセス 藥妊娠折傷胎死腹中服此得瘥一方炒黑豆令焦 獨活止連服前直淋酒亦効莫如加獨活効速凡產 至八分去滓温服日進無時以差為度或卒中未有 右於鉄銚中炒黑豆今焦黑候煙起以無灰好酒二 後服黑神散皆宜以豆淋酒調服活血祛風最為要 沃之安麓器中每用酒一盏去豆入獨活同煎約 酒沃之入水一盏煮熟入獨活未煎去滓温服 黑旦半片獨活 卷三百五十 碎雨

火足四車八号 图 大蒜湯 於鐺內急機以綿隱取酒做温服一 灌之一方以三十瓣水三升煮取一升灌之 用川鳥五兩剉取黑豆半升同炒半黑以酒三升鴻 右以大蒜每取兩瓣拍碎水一盏半煎至七分去滓 獨活湯一方無獨活以豆林酒調荆芥末妙 不開者約開口灌之未効加雀糞一合炒內酒中服 治產後中風身如角弓反張口噤不語 治産後中風角弓反張口不能言 普濟方 小盛取汗若口 型儿

黃香酒 **乗虚入客於半身日加痿率而為偏枯也** 之氣血環周一身無或偏廢産後中風偏枯者由新 無力 後氣血俱耗不能周營於肌肉肢體或偏虛風邪 以搖為度 中風偏枯附論 す 治產後中風偏枯半身不遂言語不利疼 卷三百五十 人是四年全島 天雄散 温服 右剉如麻豆用生絹袋盛於四斗醇酒內浸三日毎 黄耆 當歸始鳥頭炮縣去 去苗山茱萸 葉 蓋不拘時 蓟 頭 葛根分三防風 皮膝 五味子吃白水 治産後中風偏枯手足 獨活去 盖桂去 普濟方 附子 ~粗蜀椒! 祭各三 皮臍 炮裂去 四两号前 痿弱無力 炒出汗 閉口并 土苗乳姜炮 白芷 甘草 至 白术 細細 附

枫附湯 右為散每服二錢温酒調下不拘時 蜀 治產後中風手足偏枯筋脉弛緩疼痛無力 苓去黑甘草以 汗半两當歸切焙口者微當婦切焙 出汗 目并 細辛 三分麻黄去根山茱萸去心焙麻黄去根山茱萸 丰 P#) 草與麻黄去麻時杏仁內者附子炮級去防風 卷三百五十 两鳥頭炮 半两防風二两 防風去桂去 粗

防風湯 獨活湯 災定四車全書 或痛 擘煎至七分去滓温服不拘時候 右剉如麻豆每服三錢水一盞入生姜三片棗 防風 名獨活寄生湯方見中風類 全書 外狗春 治產後中風偏枯疼痛拘變 治產後中風偏枯手足不隨疼弱無力或痰 天雄炮縣去 乾姜炒虾

獨活飲 右 破煎七分去滓温服不拘時 右剉如麻豆每服三錢水一蓋煎至七分去滓温服 獨活去蘆杜 窮 **剉如麻豆每服三錢水一** 一根師 附子 治產後中風偏枯半月不收麻痺不仁 去机皮到 皮麻土与樂 一啊 分柱去粗皮 去粗皮 りつ 蓋生姜三片素 當歸城秦九去苗 膝去苗 酒 細辛去 当 柒

菖蒲湯 尺三日草 白雪 能自舉心下多驚 右剉如麻豆每服三錢水一 不拘時 出麻黄節 組辛去苗防風去港活或 當歸切 蜀椒生二年雨 治産後中風偏枯手足不仁或筋脉無力不 治産後中風偏枯 去目并閉口者 兩華操於附子 普濟す 一盏煎至七分去滓温服 五

經絡產則血氣俱傷腑臟皆虛心不能統? 產後中風恍惚者由心主血血氣通榮衛腑臟偏循 煎七分去滓温服不拘時候 石粗搖節每服三錢水 即為風邪所乗今心神恍惚不安也 明 中風恍惚附論 當歸物防風 卷三百五十 一些白茶 粗皮 雨 去黑

炎定四車全馬 黄丸 石為末入研樂今与煉蜜和提五七百杵九如 脳 犀角屑 **大不計時候以薄荷竹瀝酒研破一凡服之** 赤箭 羚羊角屑~生乾地黄 治産後中風心神恍惚或時口噤 为主蓝 茯神 甘粕花 呵 .普濟方 當歸炒機桂心 節 節身以防風五產龍去根九城以防風五產龍 芎藭 朱砂細研水雅 獨活 至 麝香細 川烏

獨活散 肢壯熱 右為粗散每服四錢以水一中蓋入生姜半分煎至 上谷半两 甘莉花 荆子 獨活 治產後中風恍惚語澁心胸不利頭目疼痛四 桂心 不計時温服 销 根防風去蘆頭石膏 赤芍藥 卷三百五十 參頭 羚羊角屑 犀角屑 茯神 甘草

琥珀散 人足口事心与 圆 肢拘急 計時候温服 右為粗散每服 琥珀研徒 防風 治産後巾 神的 参門 風恍惚語溢心神煩悶四肢 樂各半廿草 普消す 久培去 シ去島浦 中蓋煎至六分去滓 做赤剉 分炎 獨活 言語蹇漩四 至

金少也是有量 右為粗散每服四錢水一中盡入生姜半分煎至六 州做桂心 **三焙** 丙各 芎藭 班過 赤箭 治產後中風恍惚語溢口角涎出 **不計時温服** 防風五蘆酸棗 卷三百五十 獨活為一白附子 朱去 庫 年角月 炒遠志去麥門冬去 災骸赤已 當歸

次定四車到馬 神 以竹瀝酒下五十九 右為末研樂令与煉蜜和凡如梧桐子大不計時 餬 獨活谷三 琥 珀 治産後風邪所中心神恍惚志意不定 兩遠志出白敬 取以三水五 阿 桂心的半 两 普酒方 黄糖 一年乳香 鉛霜獅麝香和所各时 龍盛 去蘆防 半 頣 兩 甘草料 風去蘆荆芥 孟 赤两剉炙

候温服 右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時 時候温服 右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計 角盾 速志去防風去蘆頭甘草半两果麥門冬去鈴至 微挨神谷三 治產後中風心神恍惚言語錯誤煩悶 酸果仁 卷三百五十 獨活 桂心 當歸

大江日日下八十 能温於肌屑使人虚乏 夫產則血氣勞傷臟腑虛弱而氣冷客之 天麻凡 服之 為未糯米軟飯為凡如梧桐干 炒白附子兒五靈胎 天脉 風虚勞損附論 硃砂 產後中風恍惚語溢四肢不利 防風 持済す '疲致羸損不平復若久不瘥風 港活两 雄雀糞ガキ 薄荷酒研十五 強数少 梅於血氣不 弄

多岁日月 白重 炮 澤蘭於七防風 臟則 脫臟冷亦使無子謂風虚勞損也 **芍藥** 石斛 卷三百五十 當歸 川芎谷五乾姜 甘堂 損黄瘦 各四 藁本 **北細辛** 白术 栢

大王日本 八時 ナ崩れ 腹内冷疼四肢乏力 石為細末煉審為凡如梧桐子大酒下二十九或 澤廟 **装焼食桂心** 治産後虚損夹風勞氣飲食减少面色萎苗 黄耆当白术 去汗厚朴民令香熟各一两葉本 芎藭 木香 骨酒方 當歸州微 相子仁 去蘆白茯苓 赤石脂香 細辛 至 龍骨 附子 白

泽蘭丸 右為末煉蜜和搖五七百杵九如梧桐子大每服空 胎 澤蘭分馬餘糧 及晚食前以温酒下三十九 蜀 治産後風虚並治之 内族塔 白术 鹿茸 **炒湯浸去白港活三** 相子 防風谷十石膏 细辛~四轮地黄 仁各五桂心 甘草 赤石 當

たこりはんか 牛膝九 飲食 右治下節酒服方寸七日三 門子 牛膝は白薇 柯 り根土當師 過各一两十一做黃到川細研水雅土中去粗皮炙川 治産後風虚勞損臟腑之弱四肢羸困不思 皮腳 澤蘭 少数五味子 乾姜 粗彩細辛 壮螺研為黄者当熟乾地黄 普瀬方 以意増ラ 草解對甘草矣微 防風 才 姜 祖 及 財 桂心

乳少巴尼 白榝儿 飲食减少日漸羸瘦 右為末煉審和搖三五百杵九如梧桐子大每 牡丹皮 及晚食前以温酒下三十九 續斷 香熟各 治産後風虚勞損腹痛冷氣脚膝無力痿黄 當歸 桂心 卷三百五十 北細辛 川芎 赤石脂 厚朴 龍骨 白水

たとり年心時 稻子仁丸 飲食眠卧 防風去蘆 相子仁 治産後風虚勞損四肢羸弱 如梧桐子大食前温服酒下 去蓝 持濟す 剉微 雅遇 甘草 附子 冬去心 神虚煩不能 竞 做赤 赤分 桂心 焙 各

多ジャカノニ 亦得 右為細末煉蜜儿如梧桐る 右為末入研藥今白 漏蘆 五加皮 大每服於空心及晚食前以温酒下三十九 一防風 療産後風虚劳損四肢疼痛心神虚煩不思飲食 白术 桂心 川芳各三 卷三百五十 酸聚仁 煉蜜和搖三二百杵凢如梧 人參 人温酒下三十凡荆 羚羊角盾 黄耆 當歸 柯

たとの日本から 日 心及晚食前以温酒下三十九 羸弱飲食無味 右為末煉蜜和盤三五百杵九如梧桐子大每於空 麻羌活 白芍縣 五叶椒皮矣或三分相子仁 白嶶 附子炮製去石斛 治產後風虚勞損寒熟發渴血脉虛竭四肢 丹皮 當歸炒 普游方 其根白术分三 五味子 黄耆当人 热乾地黄 ,各中甘草 战赤到 芎藭 分玉 蓝桂 白茯苓 六十 肉挺岩 各

澤崩九 金歩り 澤崩れ 右為細末煉蜜九如梧桐子大每用酒下二十九至 二十九日二 澤蒯 澤蘭葉於白芷 川椒 桂心分三川芎 遠志分 赤石脂 上と言 療産後患風冷氣腹內不調補益肥白悅懌 治庭後風虛勞揭羸弱百病必劾方 厚朴 服 人参 白木 卷三百 甘草 石斛 栢子に Б 燕夷仁 藁本 乾地黄谷六 旗美仁 北丘味子 續斷 白細辛 黄耆 防風

处已日本人時 延年澤蘭九 治産後風虛損瘦不能食服此今人肥 右為細末煉盛九如梧桐子大空心温酒下二十九至三 九日二服是生冷蘇滑猪生 熊炭仁 澤蒯 栢子に 各面川芎 當歸 白芷 桂心谷 四白术 加 當聯 栢子に 甘草《厚朴 音清方 乾薑 甘草谷乾地黄 防風 ~崔肉葱麵桃木 与樂谷三石情か 葉本 桂心 厚朴 1 食茶英

金グリルノニモ 羌活散 右為細末煉蜜九如梧桐子大酒服十五九至二 右為粗散每服三錢以水一中益入生薑半分煎至 飲食四肢少力 **丁五九日二服忌法如前** 当骨碎補為*熟乾地黄一桂心 分白芷 羌活 治產後風虚勞損身體疼痛時有煩熱 赤箭 白芍薬 防風 卷三百丘 羚羊角盾 芎藭 臼茯苓 當婦別做 細辛的 黄耆 半 各剉

うこうこくけ 飲食 治産後風虚紫 ٤ 防風去蘆 想三五百杆九如梧 **时温服** 港活 普齊方 上加皮 生

到另四月全書 T **候以温酒下三十九 右為末煉蜜和搖三五百杵丸如梧桐子大不計時** 温酒下三十丸 治產後風虚勞損氣攻臍腹疼痛 去欲及當歸 炒剉 微炒熟乾地黄 卷三百五十 五蓝白水分三 頭 相子仁 白樹

熟乾地黄散 **欠定四車至野** 飲食 右㕮咀安服三錢水 分去滓温服 木香 桂心 川芎谷三熟乾地黄 治產後風虚勞損氣攻心腹四肢疼痛 疼 白水 治産 各半 後風虚勞損四肢煩疼 .普濟す 一蓋入姜三片聚一枚煎至七 當歸 附子谷 白芍藥 李 甘甘

右搖篩為散每服四錢以水 渐加羸瘦 枚同煎至六分去滓温服日三服 治産後風虚勞損羸瘦四肢無力不思飲 黄者当各野羊角屑 卷三百五十 去蘆頭當歸 中蓋入生姜 羗活

シニード ハナー 空心温服 去脂膜姜棗 右為粗未每服三錢先用水二大 黄耆 桂心 各半甘草 治産後風虚労 白ボ 當歸 川芎 个同放至一盏去猪肾入藥煎至四分去 木香 白芍樂 防風 普瀬方 損羸瘦不思飲食四肢疼 羚羊角盾 白茯苓 白茯苓各半甘草 白术 六四

黄者當歸散 卸灰四月全書 當歸散 右為散以水七升煮取三升分温三服 去滓温服不拘時 右吹咀每服三錢水一中姜三片棗一枚煎至七分 黄耆 川芎 治産後風虚勞損四肢疼痛不欲飲食 判假白苔藥 生姜谷 當歸 療産後風虚羸瘦不生肌肉勞弱無 当 楽 大東村二 卷三百五十 学期的一黄者 人祭而一桂心 到两防風 甘草

ごうはんじ 升半每服用肉汁 温服日三服 頣 中盖入藥四錢煎至六分 茳

	T 38 2 1-84	 	775 X.X.		
普濟方卷三百五十					卸分四月在書
二百五			,		
+					卷三百五十